



ΕΡΠΕΤΑ

ΦΙΔΙΑ

Φ1 Εφιδός (*Dolichophis caspius*)



ΟΔ. 92/43

Το πλέον διαδεδομένο στην περιοχή φίδι. Μεγαλόσωμο, φτάνει έως και τα 2 μέτρα. Το χρώμα των ενήλικων είναι λαδί, σταχί ή καφεκίτρινο με πολλές ανοιχτόχρωμες ραβδώσεις και ξεχωρίζει από τα μεγάλα μάτια του.

Φ2 Θρακικός Λαφίτης (*Elaphe sauromates*)



Ο Θρακικός Λαφίτης που απαντά στην περιοχή της Θράκης, έχει σώμα μπεζκαφέ στικτό και μαύρη γραμμή πίσω από το μάτι. Εντυπωσιακό φίδι (2,5 μ. Max) που, αν και ζει στο έδαφος, είναι ικανός αναρριχητής αλλά και κοιλυμβητής.

Φ3 Οχιτιά (*Vipera ammodytes meridionalis*)



ΟΔ. 92/43

Είναι το πιο επικίνδυνο ερπετό της περιοχής, αλλά συναντάται πολύ σπάνια. Το χρώμα της είναι γκριζοκαφέ, με τα αρσενικά να είναι πιο γκριζωπά και τα θηλυκά πιο καφεύ. Έχει το χαρακτηριστικό «κέρατο» στην άκρη του ρύγχους, στη ράχη της ραβδώση που σχηματίζει ζικ-ζακ, πηλάτυ κεφάλι και σώμα. Όταν νιώθει ότι απειλείται κουλουριάζει το σώμα της και σφυρίζει συνεχόμενα.

Φ4 Ερμηόφιδο (*Eryx jaculus*)



ΟΔ. 92/43

Ολικό μήκος έως 80 εκ. συνήθως όμως είναι μικρότερο. Κυρίως νυκτόβιο. Χαρακτηριστική «κοιλιά» ουρά που μοιάζει στο σχήμα με το κεφάλι. Ψάχνει για τη λεία του συνήθως μέσα σε τρύπες τρωκτικών ή στήνει ενέδρες κάτω από την άμμο ή στο χώμα, όπου θάβεται με επιδεξιότητα.

Φ5 Σαΐτα (*Platycephalus najadum*)



ΟΔ. 92/43

Λεπτό μακρύ φίδι με χαρακτηριστικές κηλίδες πίσω από το κεφάλι. Πολύ νευρικό και ασύγκριτα γρήγορο. Σκαρφαλώνει επιδέξια σε θάμνους, βράχια και πετρώτους.


Φ6 Νερόφιδο (*Natrix natrix persa*)



ΟΔ. 92/43

Το Νερόφιδο είναι πολύ επιδέξιος κοιλυμβητής αν και δραστηριοποιείται και έξω από το νερό. Φίδι μεσαίου μεγέθους (1μ. max), το συναντάμε σε διάφορα χρώματα αλλά συνήθως μεταλλικό σκούρο μπλε ή μαύρο. Έχει σκούρες ραβδώσεις και δύο

Φ7 Λιμνόφιδο (*Natrix tessellate tessellate*)



ΟΔ. 92/43

Οι δύο χερσόβιες χελώνες που συναντάμε

ηλεκές ή κίτρινες γραμμές στην πλάτη, ενώ πολύ συχνά έχει «κοιλάρ» στο λαιμό από ηλεκές ή μαυροκίτρινη ραβδώση. Το Λιμνόφιδο μοιάζει σημαντικά με το νερόφιδο, αλλά το χρώμα του είναι σχεδόν πάντα λαδί ή γκριλαδί, το κεφάλι του είναι μακρύτερο αναλογικά με το σώμα του και τα μάτια και τα ρουθούνια του είναι τοποθετημένα ψηλότερα πάνω στο κεφάλι. Σε αντίθεση με το Νερόφιδο, δραστηριοποιείται μόνο μέσα ή δίπλα στο νερό.

ΧΕΛΩΝΕΣ

Χ1 Σικτή νεροχελώνα (*Emys orbicularis*)



ΕΚΒ

Χ2 Γραμμωτή νεροχελώνα (*Mauremys rivulata*)



ΟΔ. 92/43

Οι δύο υδρόβιες χελώνες της περιοχής αλλά και όλης της Ελλάδας. Η Σικτή νεροχελώνα ξεχωρίζει από τα κίτρινα στίγματα στο λαιμό και το καβούκι της που είναι σκούρο πράσινο. Η Γραμμωτή διακρίνεται από τις υπόλευκες ραβδώσεις που έχει στο λαιμό και τα πόδια της, ενώ το καβούκι της είναι πιο κοντό και πηλάτυ από της Σικτής.

Χ3 Γραικοχελώνα (*Testudo graeca*)



ΟΔ. 92/43

Χ4 Μεσογειακή χελώνα (*Testudo hermanni hermanni*)



ΟΔ. 92/43

Οι δύο χερσόβιες χελώνες που συναντάμε

στην ευρύτερη περιοχή. Το καβούκι της Γραικοχελώνας είναι καφεκίτρινο με μαύρα σχέδια. Πάνω από την ουρά της έχει μία μόνο πλάκα και στα πίσω της πόδια σχηματίζονται εξογκώματα. Η Μεσογειακή είναι πιο σπάνια στην περιοχή από τη Γραικοχελώνα και διακρίνεται από τη διπλή πλάκα πάνω από την ουρά, αλλά και τις φοιίδες (νύχι) στην άκρη της ουράς.

ΣΑΥΡΕΣ

Σ1 Πρασινόσαυρα (*Lacerta viridis meridionalis*)



ΟΔ. 92/43

Μεγαλόσωμη σαύρα, ιδιαίτερα ευκίνητη, που χαρακτηρίζεται από το πράσινο σώμα της. Ιδιαίτερα τα αρσενικά είναι καταπράσινα και συνήθως το κάτω μέρος του κεφαλιού είναι έντονα γαλάζιο, ενώ τα θηλυκά μπορεί να είναι και καφετί με 2 ή 4 ηλεκές ραβδώσεις.

Σ2 Τυφλίτης ή Φιδόσαυρα (*Pseudopus apodus thracicus*)



ΟΔ. 92/43

Μοιάζει με φίδι αλλά δεν είναι. Είναι μια σαύρα χωρίς πόδια και όπως όλες οι σαύρες, έχει βλέφαρα και ακουστικά ανοίγματα. Ξεχωρίζει από τις χαρακτηριστικές αυλακώσεις και στις δυο πλευρές του σώματός του, ενώ το χρώμα του είναι κίτρινοκαφέ ή μπλε.

Σ3 Γουστέρα του Ιονίου (*Podarcis taurica*)



ΟΔ. 92/43

Ευκίνητη, εδαφόβια σαύρα, που σπάνια

σκαρφαλώνει και μένει κρυμμένη στην πυκνή βλάστηση. Μεσαίου μεγέθους σαύρα (25 εκ. max), ξεχωρίζει από την πράσινη ραβδώση που ξεκινάει από το πίσω μέρος του κεφαλιού και τελειώνει κοντά στα πίσω άκρα.

Σ4 Κυριοδάκτυλος (*Cyrtodactylus kotschy hibroni*)



ΟΔ. 92/43

Σαμιαμί με χαρακτηριστικά κυρτά δάκτυλα. Παρά το μικρό του μέγεθος (13 εκ. max), είναι από τα λίγα ερπετά που έχει φωνή, ένα υπόκωφο τερτίσμα. Μπορεί και αλλόζιζε τα χρώματά του με ευκολία, συνήθως όμως, το συναντάμε σταχί ή σταχτοκαφέ.

ΑΜΦΙΒΙΑ

Α1 Χωματόφρυνος (*Bufo bufo spinosus*)



ΟΔ. 92/43

Είναι ο μεγαλύτερος φρύνος της Ευρώπης (17 εκ. max). Το χρώμα του συνήθως είναι καφετί με διάφορες παραλλαγές και μπορεί να φέρει και κόκκινα στίγματα. Το δέρμα του είναι τραχύ με πολλά σφαιρικά εξογκώματα. Αν και αμφίβιο δεν έχει ανάγκη το νερό παρά μόνο στην αναπαραγωγική περίοδο.

Α2 Πρασινόφρυνος (*Bufo viridis*)



ΟΔ. 92/43

Έχει παρόμοιες συνήθειες με τον Χωματόφρυνος, άλλα είναι μικρότερος (11 εκ. max) και κυρίως ξεχωρίζει από τους χρωματισμούς του που θυμίζουν στρατιωτική παραλλαγή. Το βασικό χρώμα του σώματός του είναι μια απόχρωση του καφέ με εκτεταμένες σκούρες πράσινες κηλίδες στη ράχη και τα πόδια.

Α3 Δενδροβάτραχος (*Hyla arborea*)



ΟΔ. 92/43

Πρόκειται για ένα μικρό βάτραχο (5 εκ. max), που το χρώμα του ποικίλει από κίτρινοπράσινο έως καφέ. Έχει μια μαύρη πλωρίδα πίσω από το μάτι που διασίζει τα πτερά του. Η κοιλιή του είναι υπόλευκη, ενώ τα αρσενικά, που είναι και λίγο μικρότερα, έχουν ένα κίτρινο ηχητικό σάκο στο πιγούνι. Έχει βεντούζες στα δάκτυλά του.

Α4 Λιμνοβάτραχος (*Pelophylax ridibundus*)



ΟΔ. 92/43

Ο μεγαλύτερος και πιο κοινός βάτραχος της Ελλάδας, φτάνει τα 15 εκ. και σπανίως ακόμα και τα 18 εκ. Είναι εμφανείς οι φωνητικοί

ΕΡΠΕΤΑ ΚΑΙ ΑΜΦΙΒΙΑ

Τα ερπετά και τα αμφίβια αποτελούν δυο σημαντικές κλάσεις ειδών του βασιλείου των ζώων και μαζί με τα πτηνά και τα θηλαστικά συναποτελούν την ομάδα των τετράποδων. Δεν πρέπει να μας μπερδέψει, ότι τα φιδιά ή τα πτηνά δεν έχουν τέσσερα άκρα ή «πόδια», καθώς εξελικτικά όλα τα είδη που ανήκουν στα τετράποδα προέκυψαν από το ίδιο κοινό πρόγονο (τους

ριτιδόστους κροσσοπέτρους ιχθείς) 395 εκ. χρόνια πριν. Τα ερπετά και τα αμφίβια είναι είδη που επηρεάζονται άμεσα από τις αλλαγές του περιβάλλοντος, είτε κλιματικές είτε οικολογικές. Ταυτόχρονα αποτελούν πολύ σημαντικό κρίκο στο τροφικό πλέγμα της περιοχής καθώς αποτελούν τόσο σημαντικούς καταναλωτές (κυρίως εντόμων), αλλά και τροφή ανώτερων θηρευτών όπως είδη θηλαστικών και πτηνών. Έτσι, η παρουσία ή η απουσία τους αποτελεί ένδειξη καλής ή κακής κατάστασης τόσο του οικοσυστήματος όσο και του μικροκλίματος κάθε περιοχής. Στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνης Ισμαρίδας και των Λιμνοθαλασσών Θράκης, απαντώνται 17 είδη ερπετών και 6 είδη αμφιβίων. Τα περισσότερα από αυτά υπάρχουν και στον οδηγό αυτό (λείπουν πλγω χώρου 2

σάκοι του, που είναι γκριζοί. Είναι συνήθως γκριζοκαφέ με μία πρασινωπή ή κίτρινωπή απόχρωση και σκούρα στίγματα. Αποκλειστικά υδρόβιος και αγελαίος.

Α5 Ευκίντος Βάτραχος (*Rana dalmatina*)



ΟΔ. 92/43

Πολύ ευκίντος βάτραχος με μακριά πίσω άκρα, που το βοηθούν να κάνει μεγάλα άλματα. Το μήκος του δεν ξεπερνάει τα 9 εκ. και το χρώμα του ποικίλει από κίτρινοπράσινο έως καφέ στη ράχη και ασπροκίτρινο στην κοιλιή. Στα πίσω πόδια έχει σκοτεινές ηωρίδες και μερικές φορές στίγματα στη ράχη.

Α6 Πηλοβάτης (*Pelobates syriacus*)



ΟΔ. 92/43

Ακριβοθώρτος ο Πηλοβάτης με χρωματισμό παραπλήσιο του πρασινοφρύνου αλλά συνήθως τα δυο κύρια χρώματά του είναι αποχρώσεις του πράσινου. Μερικές φορές έχει στη ράχη μικρά εξανθήματα και κόκκινα ή καφετιά στίγματα. Χαρακτηριστικό του γνώρισμα αποτελεί μια κόνδυρινη προεξοχή στα μπροστά πόδια, η οποία τον βοηθάει να σκάβει στην άμμο όπου κρύβεται την ημέρα.

σαύρες, η Τρανόσαυρα, μια μεγάλη πράσινη σαύρα και ο Οφίσιωψ, μια σαύρα με βλέφαρα σαν φιδιού που όμως είναι πολύ σπάνια στην περιοχή. Τα ερπετά της ευρύτερης περιοχής της Ισμαρίδας ανήκουν σε 2 τάξεις, τις Χελώνες και τα Λεπιδοτά, στα οποία ανήκουν τόσο τα φιδιά (Οφίδια) όσο και οι σαύρες (Σαύρια). Υπάρχουν 4 είδη χελώνας, 7 είδη φιδιού και 6 σαύρες. Τα αμφίβια απειλούνται από 6 βάτραχους-φρύνους (Ανoura). Τα πιο κοινά ερπετά που απαντούν, είναι η Γραικοχελώνα και η Τρανόσαυρα, αλλά σημαντική απουσία παρουσιάζουν το Αστραπόφιδο, η Πρασινόσαυρα, οι δυο νεροχελώνες και το νερόφιδο. Από τα αμφίβια τα πιο κοινά στην περιοχή είναι ο δενδροβάτραχος, ο λιμνοβάτραχος και ο πρασινοφρύνος. Πρέπει να τονίσουμε, ότι το μόνο επικίνδυνο φίδι της περιοχής είναι η Οχιτιά η οποία όμως δεν είναι καθόλου κοινή. Αφήνοντας, για λίγο στην άκρη, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν πολλά από αυτά τα είδη, ήμμε να γνωρίσουμε πως τα ξεχωρίζουμε, που μπορούμε να τα συναντήσουμε και κάποιες από τις συνήθειες αυτών των τόσο αξιοθαύμαστων ζώων, που συχνά (κυρίως τα φιδιά) αναμειγνύονται με φόβο και προκατάληψη.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ:

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑ } ●●●


ΔΙΑΤΡΟΦΗ } ●●●

ΚΑΘΕΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ } ●●●

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 24ΩΡΟ } ●●●

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ } ●●●

π.χ. Πρασινόσαυρα με αντιστοιχία στη φωτογραφία με κωδικό Σ1



ΥΔΑΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΚΩΔ. NATURA GR1130009

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

- Φύλλα
- Φυτικό υλικό - Υδρόβια βλάστηση
- Ασπόνδυλα
- Υδρόβια έντομα
- Ψάρια
- Μικρά αμφίβια
- Μικρά ερπετά
- Φίδια
- Αυγά
- Μικρά πτηνά
- Μικρά θηλαστικά

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 24ΩΡΟ

- Ημερόβιο
- Λυκόφως
- Νυκτόβιο

ΣΗΜΑΝΣΗ ΧΑΡΤΗ

- Χωματόδρομοι
- Δρόμοι
- Δίαυλος Ισμαρίδας
- Ποτάμια - Κανάλια

ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

- | | | | | |
|-------------------|-------------------------|------------|-------------------|-----------|
| Θάλασσα | Σύνολο χερσαίας έκτασης | Λασπότοποι | Θαμνώνες | Χωράφια |
| Λιμνοθάλασσοι | Αλυκή | Υγρολίβαδα | Παραποτάμιο δάσος | Αμμοθίνες |
| Λίμνες | Αλυμρολίβαδα | Καθαμιώνες | Δασώδεις εκτάσεις | Οικισμοί |
| Ποτάμια - Κανάλια | Αλυτούχα έλη | | | |


Στο Νοτιοδυτικό τμήμα του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης βρίσκεται το Υδατικό Σύμπλεγμα της Λίμνης Ισμαρίδας και των Λιμνοθάλασσών Ροδόπης. Ολόκληρη η πεδινή αυτή περιοχή έχει σχηματιστεί από τις αποθέσεις των ποταμών και χειμάρων που πηγάζουν από τα βουνά της Οροσειράς Ροδόπης.

Η Λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού ή Μάννα) με έκταση 3,4 km², μέγιστο βάθος 1,5 m, είναι η τελευταία λίμνη γλυκού νερού της Θράκης, καθώς οι υπόλοιπες έχουν αποξηρανθεί εδώ και δεκαετίες. Καλύπτεται περιμετρικά, από τον εντυπωσιακό καθαμιώνη της, ενώ σε μεγάλη έκταση της επιφάνειας της αναπτύσσεται υδρόβια βλάστηση. Οι δυο αυτοί οικότοποι, εκτός από τα χαρακτηριστικά αισθητικά τη λίμνη, παρέχουν προστασία και διατροφή σε πτηνά, ψάρια, αμφίβια, έντομα ακόμα και θηλαστικά. Στα βόρεια της λίμνης εκβάλλει σχηματίζοντας ένα μικρό δευτεακό σχηματισμό ο ποταμός Βοσβόζης. Η Ισμαρίδα στη νότια πλευρά της συνδέεται με τεχνητό διάυλο 5,2 km, με τον Όρμο Ανοικτού στο Θρακικό πέλαγος. Ανατολικά της διαρρέει και ένας δεύτερος ποταμός, μεγαλύτερος από τον Βοσβόζη, ο Λίσσος (Φιλιούρης). Παράλληλα με τις κοίτες των

ποταμών, εμφανίζεται ενδιαφέρουσα παραποτάμια βλάστηση. Δυτικά και νότια της Ισμαρίδας και σε άμεση επικοινωνία με τη θάλασσα βρίσκονται, πολύ κοντά η μία στην άλλη, οι λιμνοθάλασσες της Ροδόπης. Από τα ανατολικά προς τα δυτικά συναντούμε τις λιμνοθάλασσες Λίμνης, Έλους, Πτελέας, Αλυκής (Μέσης), Αρωγής (Καρατζό) και Ξηρολίμνης (Φαναρίου), συνολικής έκτασης 14 km². Κοντά στις λιμνοθάλασσες, εμφανίζονται λασπότοποι, έλη και λιβάδια που πλημμυρίζουν με υφάλμυρο νερό και αποστειλούν σημαντικούς και σπάνιους οικότοπους. Το ιδιαίτερο αυτό υδατικό σύμπλεγμα, παρά τις σημαντικές ανθρώπινες παρεμβάσεις, έχει διατηρήσει αρκετά αξιόλογα φυσικά χαρακτηριστικά, που το καθιστούν σημείο αναφοράς της ελληνικής βιοποικιλότητας, καθώς, σε μια σχετικά μικρή έκταση, αναπτύσσονται αρκετοί διαφορετικοί βιότοποι, ικανοί να στηρίζουν πληθώρα ειδών χλωρίδας και πανίδας.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- EKB** Ελληνικό Κόκκινο Βιβλίο
- ΟΔ. 92/43** Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τα είδη και τους τύπους οικοτόπων



Φορέας διαχείρισης
**ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ**
Delta Nestos Lakes Vistonida-Ismarida
Management Body



ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΕΙΔΩΝ
ΛΙΜΝΗΣ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΕΡΠΕΤΑ & ΑΜΦΙΒΙΑ

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ
τηλ: 25910 51831, fax: 25910 51884
e-mail: info@fd-nestosvistonis.gr
ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
τηλ: 25410 96646, fax: 25410 96924
e-mail: info@fd-nestosvistonis.gr
www.epamath.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΗ:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΜΦΙΕΤΖΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ,
ΣΤΕΡΗΝ ΘΩΝΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:
Φ2, Φ4, Φ5, Φ7, Σ2
ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΧΙΝΗΣ • www.herpetofauna.gr
Σ2
ΤΟΜΜΙ ΣΑΝΔΒΕΡΓ
ΛΟΙΠΕΣ
ΖΟΟΜ ΑΡΤ ΓΡΟΥΠ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ & ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
ΖΟΟΜ ΑΡΤ ΓΡΟΥΠ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΚΑΙ ΣΚΙΤΣΑΣ:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΣΟΓΛΟΥ

Προστασία και Ανόρθωση
Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης



ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2004-2009 ΚΑΙ 2009-2014 & ΚΑΤΑ 50% ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.



ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ